

阪神・北摂で
被害拡大中

根元を
見て!

根元の『木くず』は、 サクラからのSOSです。



クビアカ被害を放置すると、木が枯れ、
落枝・倒木事故につながるおそれがあります。

サクラを守ろう!

今すぐ根元を確認してください。

この木くずが
重要なサイン

クビアカツヤカミキリとは?

産卵(成虫が卵を産む)



サクラの樹皮のすき間に
数百個の卵を産みつける

幼虫が材の中で食害



幼虫が木の内部を食べ進み、
木くず(フラス)を出す

木が弱る



水や養分の通り道が傷つき、
樹勢が低下する

枝枯れ・木が枯れる



枝枯れが進行し、最悪の場合、
木が枯れてしまう

落枝・倒木の危険



落枝や倒木により、人や車に
危害を及ぼすおそれ

木の内側で被害が進む

外からは気づきにくい

放置すると危険

⚠ 見過ごすとクビアカが爆発的に増えサクラが枯死、周りの桜にも被害が広がります。

豆知識

クビアカツヤカミキリは
特定外来生物に指定されています。

日本のサクラ・モモ・ウメなどに
大きな被害を与える侵入害虫です。
早期発見と早期対応が
被害の拡大を防ぎます。



サクラの根元をチェック!

① 木くず・虫のふん (フラス)

茶色～赤褐色の
木くず状のふんがたまる

最も気づきやすいサイン

② 幹の穴・樹液

丸い穴や
樹液のにじみに注意

③ 成虫

黒い体・赤い胸
初夏～夏に見られる

④ 枝枯れ・衰弱

葉の減少・枝枯れ・
傾きにも注意

※イメージ図。木くずだけでクビアカ被害とは断定できません。

見つけたら、この3つ

① 撮る



木全体・根元・木くずを撮影

② 記録する



場所・日時を記録

取り除く前に
写真を撮って!

③ 通報・相談する



自治体・施設管理者へ連絡

⚠ 生きた成虫を持ち帰る・飼育する・別の場所へ運ぶことは原則禁止です。

誰が対応する?



公園・道路など
自治体・施設管理者へ通報



自宅・寺社・学校・事業所など
所有者・管理者による
確認と対応が必要

助成制度や現地巡回の対応は自治体ごとに異なります。

被害が出る前の
予防・点検について

みどりテックでは、景観を崩さず、
周囲への影響に配慮した、保全重視の
予防サービスをご相談いただけます。



クビアカ被害の
見分け方と
予防対策はこちら

みどりテック

兵庫県尼崎市

<https://www.midoritech.jp/>

発行：みどりテック合同会社 (2608001)